

Título: Parálisis Braquial Obstétrica: valoración y tratamiento con Terapia Vojta. Estudio de un caso clínico.

Autor(es): Collado Vázquez S., Jiménez Antona C., Tomás Rodríguez E., Güeita Rodríguez J.

Introducción: La Parálisis Braquial Obstétrica es una de las causas más frecuentes de traumatismos obstétricos. Su incidencia varía según las series de 0,5 y 3 por 1000 recién nacidos vivos.

Descripción: Niña diagnosticada de parálisis braquial obstétrica superior derecha, tipo Erb, a la que se evalúa mediante la Tabla de la ontogénesis del Dr. Vojta, para valorar la afectación del miembro superior y su repercusión en el desarrollo, tanto en decúbito supino como en prono. Como tratamiento de fisioterapia se aplicó la Terapia de la Locomoción Refleja de Vojta: primera y segunda fase del volteo reflejo y reptación refleja original. Comienza la terapia a las 4 semanas de vida y se realiza un seguimiento hasta los 16 meses, fecha del alta. La paciente evoluciona hasta la recuperación total de la postura y movimiento global del cuerpo y del brazo afectado.

Discusión: El sistema de evaluación utilizado se ha mostrado eficaz para la valoración del desarrollo y presencia de asimetrías. Con la terapia de la locomoción refleja se consiguió la recuperación total de la paciente.

Conclusión: La valoración y el tratamiento propuestos por el Dr. Vojta han resultado eficaces en este caso clínico de Parálisis Braquial Obstétrica.